

ROMÂNIA  
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ



Nesecret

Anexa la nr. 553/2407-2018

**Cum să fii cu un pas înaintea Pestei Porcine Africane**

- Pesta Porcină Africană este o boală virală
- În mod obișnuit este mortală pentru porcii domestici și mistreți
- Nu există vaccin sau tratament pentru această boală
- Din această cauză provoacă serioase probleme socio-economice în țările afectate
- Virusul rezistă câteva luni în mediul înconjurător și în cadavre
- Prepararea sau afumarea cărnii de porc NU distruge virusul
- Oamenii nu se îmbolnăvesc dar ajută la răspândirea virusului prin hainele sau echipamentele contaminate
- Semnele clinice ale bolii sunt variabile și nu sunt ușor de recunoscut
- Animalele afectate pot avea unul sau mai multe semne clinice, după cum urmează:
  - Febră mare, apatie și imposibilitate de a sta în picioare
  - Vomă, diaree, uneori cu sânge
  - Pete roșii-albăstrui pe piele, în special în zonele urechilor și râtului
  - Tuse și respirație îngreunată
  - Avorturi spontane, nașteri de feteși morți și nesiguranță în mers a purcellor
  - Majoritatea animalelor infectate mor în 10 zile
- Contaminarea animalelor sănătoase se poate produce în multe feluri:
  - Prin contactul direct al porcilor sănătoși cu cei bolnavi
  - Prin hrănirea acestora cu resturi alimentare contaminate
  - Contactul cu materiale contaminante
  - Contactul cu oamenii care poartă haine și încălțăminte contaminate
- Contactați imediat medicul veterinar dacă suspectați că efectivul de animale este contaminat
- Nu deplasați animalele din fermă sau gospodărie
- Întotdeauna schimbați-vă îmbrăcămintea și încălțăminte atunci când părăsiți ferma sau gospodăria
- Înainte de a achiziționa furaje, așternut și porci, asigurați-vă că acestea provin din unități verificate, care au implementate toate măsurile de siguranță pentru a evita pătrunderea virusului
- Asigurați-vă că porcii din gospodăria dumneavoastră nu intră în contact cu mistreții sau cu porcii din alte gospodării
  - Niciodată să nu hrăniți porcii cu resturi alimentare
- Evitați creșterea porcilor în padocurile exterioare, în zonele în care evoluează Pesta Porcină Africană
  - Achiziția și transportul cărnii și a preparatelor din carne de porc din zonele infectate pot răspândi virusul
  - Vânătorii și câinii acestora nu trebuie să vină în contact cu porcii domestici după vânătoare
  - Fermierii sau vânătorii să nu arunce pe câmp sau în pădure resturi rezultate în urma eviscerării carcaselor de porci domestici sau mistreți
  - Nu aruncați resturi alimentare sau gunoși în zonele care pot fi frecventate de mistreți
  - Contactați medicul veterinar dacă găsiți cadavre de mistreți chiar dacă în zonă NU evoluează PESTA PORCINĂ AFRICANĂ